

## **Reducir la transmisión vertical es una realidad:**

### **Informe de Avance**

**Jaime Galindo, M.D.  
Universidad del Valle**

**Corporación de Lucha contra el Sida  
Colombia**



**CORPORACIÓN DE LUCHA CONTRA EL SIDA**

**hágase ya  
la prueba  
del  
SIDA!**

Y SERVA BIEN DE SU TIPO  
SU VERDADERA PRUEBA

DE AMOR

**■ PROYECTO PREVENCIÓN DE  
LA TRANSMISIÓN VERTICAL  
DEL VIH**

## DEMANDA DE LA PRUEBA

Proveedor de Servicios	Número de pruebas										Total
	Oct 1999 Jul 2000	Nov	Feb	May	Ag	Nov	Feb	May	Ag	Nov	
Transmex	552	278	118	174	146	215	95	221	143	148	2064
Centro de Estudios	199	65	152	158	85	129	57	88	109	224	1267
Centro de Estudios	611		238*	189	76	118	113	78	74	113	1590
Centro de Estudios	251	21	183	115	75	105	58	92	60	68	948
Centro de Estudios	626	112	382	195	150	131	128	105	108	136	2053
UNA	213	46	137	159	159	115	76	115	95	127	1242
UNA				16	26	19	131	15		53	260
<b>TOTAL</b>	<b>2432</b>	<b>529</b>	<b>1110</b>	<b>995</b>	<b>717</b>	<b>630</b>	<b>654</b>	<b>714</b>	<b>588</b>	<b>809</b>	<b>9424</b>

## INDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE LA PRUEBA EN LA GESTACIÓN



## IMPACTO DIFERENCIAL DEL PLAN DE COMUNICACIONES




## CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN




## CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

Distribución proporcional por estado civil




## CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

Distribución proporcional por escolaridad




## CAPTACIÓN



Distribución proporcional por edad gestacional



## PREVALENCIAS POR PRESTADOR DE SERVICIOS

Prevalencias halladas





# INTERVENCIÓN

## SELECCIÓN

	TOTAL	SELECCIONADAS	INTERVENIDAS
TAMIZAJE CALI	22	20	17
TAMIZAJE OTROS	8	6	6
PREVIAS	5	5	4
TOTAL	35	31	27




## INTERVENCIÓN

- ⑩ Suministro adecuado y oportuno de medicamentos antirretrovirales durante la gestación y/o en el momento del parto a las gestantes intervenidas.
- ⑩ Cesárea electiva a las gestantes intervenidas.
- ⑩ Suministro de medicamentos antirretrovirales a los frutos de las gestaciones que fueron intervenidas.
- ⑩ Realización de pruebas de Carga viral a las gestantes y a los frutos de las gestaciones que fueron intervenidas.

## INTERVENCIÓN


**Duración promedio terapia 8 semanas (1-22)**


ESQUEMA DE TRATAMIENTO  
ADMINISTRADO





## RESULTADOS E IMPACTO





## A LA FECHA

De las veintisiete gestantes intervenidas:

- Las veintisiete ya terminaron la gestación, de ellas una (4%) tuvo un mortinato y no le fueron realizadas pruebas, y veintiséis se encuentran bajo seguimiento:
  - Una transmitió.
  - Diez no transmitieron (sus bebés tienen cargas virales indetectables después de los 6 meses de vida).
  - Nueve muy probablemente no transmitieron (sus bebés tienen cargas virales indetectables entre los 3 y antes de los 6 meses de vida).
  - Seis están pendientes por definir (sus bebés aún no tienen pruebas de carga viral).

## IMPACTO

- Eficacia de la transmisión = 5% (OR=8,14)
- Eficacia de la intervención = 83,33%
- Casos evitados = CINCO